

前立腺がんレジメン

前立腺ドセタキセル療法

カバジタキセル療法

ダロルタミド+ドセタキセル療法

レジメン名

前立腺ドセタキセル療法

インターバル： 21 日

● 患者情報

ID

氏名

生年月日

性別

醫師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

レジメン説明

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ドセタキセル	75mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール

所要時間 90分

レジメン名	カバジタキセル療法	インターバル：	21 日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m ²			
性別				レジメン説明		
医師名				催吐性リスク：軽度		

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ジェブタナ (カバジタキセル)	25mg/m2

適応条件

催吐性リスク：軽度

● 投与スケジュール

レジメン名	ダロルタミド+ドセタキセル療法	インターバル:	21日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m2			
性別		レジメン説明 催吐性リスク：軽度				
医師名		ニュペ [®] タは連日服薬（1回600mg×1日2回）				

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ドセタキセル	75mg/m2
	内服	ニュベクオ（ダロルタミド）	下記参照

レジメン説明

催吐性リスク：軽度

ニュペ[®] タバ連日服薬（1回600mg×1日2回）

適応条件

ニューベンの処方が必要

トセタキセル併用は原則6ヶ月まで

● 投与スケジュール

內服藥

レジメン名	イミフィンジ療法	インターバル:	28 日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						

● 患者情報

ID

氏名

生年月日

性別

醫師名

身長	cm
体重	kg
体表面積	m ²

レジメン説明

催吐性リスク：最小度

体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kg

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	イミフィンジ	1500mg

適応条件

● 投与スケジュール

所要時間 60分