

胆道がんレジメン

GCS療法

胆道GC療法

胆道GS療法

イミフィンジ+GC療法

キイトルーダ+GC療法

キイトルーダ+ゲムシタビン療法

レジメン名

GCS療法

インターバル： 14 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID
氏名
生年月日
性別
医師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

--	--	--

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ゲムシタビン	1000mg/m ²
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	25mg/m ²
	内服	S-1	下記参照

● 投与スケジュール

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	所要時間 180分 次クールへ														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩パック「フリーアップ」▲500mL▼硫酸Mg補正液20mL(マグネシウム代替) *点滴速度 500mL/h	1袋 1筒		1本目														
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトロン静注0.75mg/5mL(アロキシVHJ) ★■デキサート注射3.3mg/ml(デカドロン後) *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管		2本目														
	点滴静脈内(速度)	★ゲムシタビン点滴(200mg,1g)ジエムザール後発 大塚生食注 ▲100mL▼ *点滴時間 30分かけて	0mg 1瓶		3本目														
	点滴静脈内(速度)	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩パック「フリーアップ」▲500mL▼(レジメン用) *点滴時間 1時間かけて	0mg 400mL		4本目														
	点滴静脈内	▲50mL▼大塚生食注 全開で点滴	1瓶		5本目														

内服薬

	薬剤略称		タイミング	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	S-1 《体表面積》 1.25m ² 未満 1.25m ² 以上～1.5m ² 未満 1.5m ² 以上	《1回量》 40mg/回 50mg/回 60mg/回	朝夕															

--	--	--

レジメン説明

催吐性りん：中等度 (NK1RA併用推奨)

S-1は1週間服薬1週間休薬 (1回40mg/m²×1日2回) E法

レジメン名

胆道GC療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID
氏名
生年月日
性別
医師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

レジメン説明
催吐性リスク：中等度（NK1RA併用推奨）

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ゲムシタビン	1000mg/m2
	点滴静脈内(速度)	シスプラチナ	25mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール

レジメン名	胆道GS療法	インターバル:	21日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報	ID 氏名	身長 体重	cm kg			

レジメン説明

催吐性リスク：中等度

S-1は2週間服薬1週間休薬（1回30mg/m²×1日2回）F法

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ゲムシタビン	1000mg/m2
	内服	S-1	下記参照

适应条件

S-1の処方が必要（用量注意）

● 投与スケジュール

內服藥

レジメン名

イミフィンジ+GC療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID
氏名
生年月日
性別
医師名

身長
体重
体表面積

cm
kg
m²

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

レジメン名

キイトルーダ+GC療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

10

氏名

生年月日

性別

正方
醫師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

レジメン説明

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	キイトルーダ	200mg
	点滴静脈内(速度)	ゲムシタビン	1000mg/m2
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	25mg/m2

適応条件

原則、8クールまで

● 投与スケジュール

レジメン名

キイトルーダ+ゲムシタビン療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

|D

氏名

牛年月日

性別

江別
医師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

レジメン説明 催吐性リスク：軽度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	キイトルーダ	200mg
	点滴静脈内(速度)	ゲムシタビン	1000mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール