

悪性神経膠腫レジメン

脳ベニズマブ療法(2週毎)

ベニズマブ療法(3週毎)

レジメン名 脳ベバシズマブ療法（2週毎）

インターバル： 14 日

## ● 患者情報

ID

氏名

生年月日

性別

医師名

身長 cm  
体重 kg  
体表面積 m<sup>2</sup>

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

## ● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ベバシズマブ (BS)	10mg/kg

## レジメン説明

催吐性リスク：最小度

ベバシズマブは投与時の忍容性が良好なら点滴時間の短縮が可能  
(2回目：60分、3回目以降：30分)

## テモゾロミド併用可

- 放射線療法併用中は42日間服薬28日間休薬（1回75mg/m<sup>2</sup>×1日1回）
- それ以外は5日間服薬23日間休薬（1回150mg/m<sup>2</sup>×1日1回）

(※2クール目以降、1回200mg/m<sup>2</sup>×1日1回へ增量可)

## 適応条件

## ● 投与スケジュール

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	所要時間 90分														次クールへ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	点滴静脈内(速度)	★ベバシズマブ BS注(100mg,400mg)VHJ 大塚生食注 ▲100mL▼ *点滴時間 90分かけて	0mg 1瓶		1本目														
	点滴静脈内	▲50mL▼大塚生食注 全開で点滴	1瓶		2本目														

レジメン名 ベバシズマブ療法（3週毎）

インターバル： 21 日

## ● 患者情報

ID

氏名

生年月日

性別

医師名

身長 cm  
体重 kg  
体表面積 m<sup>2</sup>

## ● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ベバシズマブ (BS)	15mg/kg

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

--	--	--

## レジメン説明

催吐性リスク：最小度

ベバシズマブは投与時の忍容性が良好なら点滴時間の短縮が可能  
(2回目：60分、3回目以降：30分)

## 適応条件

## ● 投与スケジュール

所要時間 90分

次クールへ

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	点滴静脈内(速度)	★ベバシズマブ BS注(100mg,400mg)VHJ 大塚生食注 ▲100mL▼ *点滴時間 90分かけて	0mg 1瓶		1本目																				3週目	
	点滴静脈内	▲50mL▼大塚生食注 全開で点滴	1瓶		2本目																					