

## 頭頸部がんレジメン

シスプラチン+放射線療法

アービタックス+パクリタキセル療法

頭頸部アービタックス療法

医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント

ID	身長	cm
氏名	体重	kg
生年月日	体表面積	m2
性別		
医師名		

催吐性リスク：高度

## 適応条件

[illegible]

レジメン名	アービタックス+パクリタキセル療法	インターバル：	28 日
-------	-------------------	---------	------

● 患者情報

ID		身長	cm
氏名		体重	kg
生年月日		体表面積	m2
性別			
医師名			

医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント

レジメン説明

催吐性リスク：中等度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	パクリタキセル	80mg/m2
	点滴静脈内(速度)	アービタックス	初回：400mg/m2 2回目以降：250mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール

● 投与スケジュール				所要時間	初回：220分 2クール目以降：160分																													
RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	160分							160分							160分							90分							次クールへ	
				(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
					1週目							2週目							3週目							4週目								
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ ★■デキスト注射3.3mg1ml(デキスト)後 静注ファミジン20mg20mL (カスター) ポラミン注5mg 1mL (車×) * 点滴時間 30分かけて インラインフィルター使用	1瓶 3管 1管 1管		1本目							1本目							1本目															
	点滴静脈内(速度)	★パクリタセル注(30mg,100mg)デキソール：車× ▲250mL▼ 5%ブドウ糖液 * 点滴時間 1時間かけて インラインフィルター使用	0mg 1袋		2本目							2本目							2本目															
	点滴静脈内(速度)	▲50mL▼大塚生食注 * 点滴時間 6分かけて	1瓶		3本目							3本目							3本目															
	点滴静脈内(速度)	★アービタックス注射液100mg 20mL 初回の場合 点滴生理食塩バッグ「フソー」▲500mL▼ (レジメ * 点滴時間 2時間かけて 2回目以降の場合 大塚生食注 ▲100mL▼ (レジメン用) * 点滴時間 1時間かけて	0mg 500mL 100mL		4本目							4本目							4本目								2本目							
	点滴静脈内(速度)	▲50mL▼大塚生食注 アービタックスと同じ速度で点滴	1瓶		5本目							5本目							5本目								3本目							
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ ★■デキスト注射3.3mg1ml(デキスト)後 ポラミン注5mg 1mL (車×) * 点滴時間 30分かけて	1瓶 2管 1管																							1本目								

レジメン名

頭頸部アービタックス療法

インターバル：7日

● 患者情報

ID

氏名

生年月日

性別

医師名

身長

体重

体表面積

cm

kg

m2

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

レジメン説明

催吐性リスク：最小度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	アービタックス	初回：400mg/m2 2回目以降：250mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール

初回：150分  
2回目以降：90分  
次クールへ

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	所要時間	(日)	1	2	3	4	5	6	7	8
						1週目							
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカトロン後 ポラミン注5mg 1mL (車×) * 点滴時間 30分かけて	1瓶 2管 1管			1本目							
	点滴静脈内(速度)	★アービタックス注射液100mg 20mL 初回の場合 点滴生理食塩バッグ「フソー」▲500mL▼ (レジメ * 点滴時間 2時間かけて 2回目以降の場合 大塚生食注 ▲100mL▼ (レジメン用) * 点滴時間 1時間かけて	0mg  500mL  100mL			2本目							
	点滴静脈内(速度)	▲50mL▼大塚生食注 アービタックスと同じ速度で点滴	1瓶			3本目							