

目次

食道がんレジメン

DCF療法

FP療法

FP+放射線療法

術前FP療法

食道ドセタキセル療法

オプジーボ+FP療法

オプジーボ+フルオロウラシル療法

オプジーボ+ヤーボイ療法

キイトルーダ+FP療法

キイトルーダ+フルオロウラシル療法

パクリタキセル療法（3週投与1週休薬）

レジメン名	DCF療法	インターバル :	21 日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m2			
性別				レジメン説明		
医師名				催吐性リスク : 高度		
● 使用する抗がん剤 :						
RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)		適応条件	
	点滴静脈内(速度)	ドセタキセル	70mg/m2			
	持続点滴静注	フルオロウラシル	750mg/m2			
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	70mg/m2			
● 投与スケジュール					次クールへ	
RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1週目 2週目 3週目
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		1本目	
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトム静注0.75mg/5mL (アキシVHJ ★■デキサト注射3.3mg1ml(デカドロン後 アカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管 1瓶		2本目	
	点滴静脈内(速度)	★トセタキセル注(20mg,80mg)キソテル後発 ▲250mL▼ 5%ドウ糖液 *点滴時間 1時間かけて	0mg 1袋		3本目	
	持続点滴静注	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		4本目 側管から同時投与の薬剤あり (day5以外)	
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネール代替) *点滴時間 90分かけて	1袋 1筒		4本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	マンニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて	1袋		5本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて	0mg 300mL		6本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		7本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩液パック「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて	1袋		8本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	ゲイソD輸液 500mL(酢酸リングルブドウ ★■デキサト注射3.3mg1ml(デカドロン後 *点滴時間 4時間かけて	1袋 2管		1本目 側管から投与	

レジメン名	FP療法	インターバル：	28日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m2			
性別				レジメン説明		
医師名				催吐性リスク：高度		
● 使用する抗がん剤：						
RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)			
	持続点滴静注	フルオロウラシル	800mg/m2			
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニン	80mg/m2			
● 投与スケジュール		所要時間		適応条件		
RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	次クールへ
					1週目 2週目 3週目 4週目	
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		1本目	
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトロン静注0.75mg/5mL (アロキシVHJ) ★■デキサート注射3.3mg/ml (デカドロン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL (VHJ) *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管 1瓶		2本目	
	持続点滴静注	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		3本目 側管から同時投与の薬剤あり (day5以外)	
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL (マグネリール代替) *点滴時間 90分かけて	1袋 1筒		3本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	マソニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて	1袋		4本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	★シスプラチニン注「マルコ」 (10mg, 25mg, 50mg) 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて	0mg 300mL		5本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		6本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩液パック「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて	1袋		7本目 側管から投与	
	点滴静脈内(速度)	ゲイエンD輸液 500mL (酢酸リングルブドウ ★■デキサート注射3.3mg/ml (デカドロン後) *点滴時間 4時間かけて	1袋 2管		1本目 側管から投与	

レジメン名	FP+放射線療法	インターバル:	28日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>● 患者情報</p> <p>ID 氏名 生年月日 性別 医師名</p> <p>身長 cm 体重 kg 体表面積 m²</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>レジメン説明 催吐性リスク：高度</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>● 使用する抗がん剤：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RP</th> <th>手技</th> <th>薬剤略称</th> <th>標準値(1回量)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>持続点滴静注</td> <td>フルオロウラシル</td> <td>700mg/m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>シスプラチニ</td> <td>70mg/m²</td> </tr> </tbody> </table>							RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)		持続点滴静注	フルオロウラシル	700mg/m ²		点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	70mg/m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	持続点滴静注	フルオロウラシル	700mg/m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	70mg/m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>● 投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RP</th> <th rowspan="2">手技</th> <th rowspan="2">薬剤略称</th> <th rowspan="2">用量/単位</th> <th rowspan="2">(日)</th> <th colspan="29">所要時間</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="7">1週目</td> <td colspan="7">2週目</td> <td colspan="7">3週目</td> <td colspan="7">4週目</td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて</td> <td>1袋</td> <td></td> <td>1本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトム静注0.75mg/5mL (アキシVHJ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ) *点滴時間 30分かけて</td> <td>1瓶 1瓶 3管 1瓶</td> <td></td> <td>2本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>持続点滴静注</td> <td>★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h</td> <td>0mg 1袋</td> <td></td> <td>3本目</td> <td>1本目</td> <td>1本目</td> <td>1本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネゾール代替) *点滴時間 90分かけて</td> <td>1袋 1筒</td> <td></td> <td>3本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>マンニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて</td> <td>1袋</td> <td></td> <td>4本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて</td> <td>0mg 300mL</td> <td></td> <td>5本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>ソルテム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて</td> <td>1袋</td> <td></td> <td>6本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>点滴生理食塩液バッグ「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて</td> <td>1袋</td> <td></td> <td>7本目</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>点滴静脈内(速度)</td> <td>グイーンD輸液 500mL(酢酸リンゴルブトウ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) *点滴時間 4時間かけて</td> <td>1袋 2管</td> <td></td> <td></td> <td>1本目</td> <td>1本目</td> <td>1本目</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	所要時間																													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						1週目							2週目							3週目							4週目								点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		1本目																												点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトム静注0.75mg/5mL (アキシVHJ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ) *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管 1瓶		2本目																												持続点滴静注	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		3本目	1本目	1本目	1本目																									点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネゾール代替) *点滴時間 90分かけて	1袋 1筒		3本目																												点滴静脈内(速度)	マンニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて	1袋		4本目																												点滴静脈内(速度)	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて	0mg 300mL		5本目																												点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		6本目																											点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩液バッグ「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて	1袋		7本目																											点滴静脈内(速度)	グイーンD輸液 500mL(酢酸リンゴルブトウ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) *点滴時間 4時間かけて	1袋 2管			1本目	1本目	1本目																					
RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	所要時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					1週目							2週目							3週目							4週目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		1本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトム静注0.75mg/5mL (アキシVHJ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ) *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管 1瓶		2本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	持続点滴静注	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		3本目	1本目	1本目	1本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネゾール代替) *点滴時間 90分かけて	1袋 1筒		3本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	マンニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて	1袋		4本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて	0mg 300mL		5本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	ソルテム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		6本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩液バッグ「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて	1袋		7本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	点滴静脈内(速度)	グイーンD輸液 500mL(酢酸リンゴルブトウ) ★■テキサート注射3.3mg1ml(テカドン後) *点滴時間 4時間かけて	1袋 2管			1本目	1本目	1本目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>適応条件</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>次クールへ</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

レジメン名	術前FP療法	インターバル：	21日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント		
● 患者情報								
ID		身長	cm					
氏名		体重	kg					
生年月日		体表面積	m2					
性別								
医師名								
● 使用する抗がん剤：								
RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)					
	持続点滴静注	フルオロウラシル	800mg/m2					
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	80mg/m2					
● 投与スケジュール		所要時間		適応条件		次クールへ		
RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22			
					1週目	2週目	3週目	
点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		1本目				
点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトロン静注0.75mg/5mL (アロキシVHJ) ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL (VHJ) *点滴時間 30分かけて	1瓶 1瓶 3管 1瓶		2本目				
持続点滴静注	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		3本目	1本目 1本目 1本目 1本目 1本目			
点滴静脈内(速度)	リルデム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネソール代替) *点滴時間 90分かけて	1袋 1筒		3本目	側管から同時投与の薬剤あり (day5以外)			
点滴静脈内(速度)	マソニットールS注射液 300mL *点滴時間 40分かけて	1袋		4本目	側管から投与			
点滴静脈内(速度)	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg, 25mg, 50mg) 点滴生理食塩パック「フロー」▲500mL▼ (レジメン用) *点滴時間 90分かけて	0mg 300mL		5本目	側管から投与			
点滴静脈内(速度)	リルデム3A輸液▼500mL▼ *点滴時間 2時間かけて	1袋		6本目	側管から投与			
点滴静脈内(速度)	点滴生理食塩液パック「フロー」▼ 1L▼ *点滴時間 4時間かけて	1袋		7本目	側管から投与			
点滴静脈内(速度)	ゲイソD輸液 500mL(酢酸リンゴルブドウ ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後) *点滴時間 4時間かけて	1袋 2管		1本目 1本目 1本目	側管から投与			

レジメン名

食道ドセタキセル療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID

氏名

牛年月日

性別

醫師名

身長	cm
体重	kg
体表面積	m ²

レジメン説明 催吐性リスク：軽度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	ドセタキセル	70mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール

所要時間 90分

次クールへ

レジメン名	オプジーボ+FP療法	インターバル:	28日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m2			
性別				レジメン説明		
医師名				催吐性リスク : 高度		

● 使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	オプジーボ	480mg
	持続点滴静注	フルオロウラシル	800mg/m2
	点滴静脈内(速度)	シスプラチン	80mg/m2

● 投与スケジュール

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
					1週目	2週目	3週目	4週目																										
	点滴静脈内(速度) 2時間かけて	点滴生理食塩バッゲ「フロー」▲500mL▼	1袋		1本目																													
	点滴静脈内(速度) 30分かけて	★オプジーボ 点滴静注(120mg,240mg) 大塚生食注 ▲100mL▼ インラインフィルター使用	0mg 1瓶		2本目																													
	点滴静脈内(速度) 6分かけて	▲50mL▼大塚生食注	1瓶		3本目																													
	点滴静脈内(速度) 30分かけて	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトロン静注0.75mg/5mL (アキシVHJ) ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ)	1瓶 1瓶 3管 1瓶		4本目																													
	持続点滴静注 24時間かけて	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩バッゲ「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		5本目	1本目	1本目	1本目	1本目																									
	点滴静脈内(速度) 90分かけて	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネシール代替)	1袋 1筒		5本目																													
	点滴静脈内(速度) 40分かけて	マンニットールS注射液 300mL	1袋		6本目																													
	点滴静脈内(速度) 90分かけて	★シスプラチン注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩バッゲ「フロー」▲500mL▼ (レジメン用)	0mg 300mL		7本目																													
	点滴静脈内(速度) 2時間かけて	ソルテム3A輸液▼500mL▼	1袋		8本目																													
	点滴静脈内(速度) 4時間かけて	点滴生理食塩液バッゲ「フロー」▼ 1L▼	1袋		9本目																													
	点滴静脈内(速度) 4時間かけて	グイーンD輸液 500mL(酢酸リンゴルブトウ) ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後)	1袋 2管			1本目	1本目	1本目																										

適応条件

次クールへ

レジメン名

オプジーボ+フルオロウラシル療法

インターバル： 28 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID

氏名

牛年月日

性別

医師名

身長

cm

体重

ka

体表面积

m2

レジメン説明

催吐性リスク：軽度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	オプジー ^ボ	480mg
	点滴静脈内(速度)	フルオロウラシル	800mg/m ²

適応条件

● 投与スケジュール

所要時間

次クールへ

レジメン名	オプジー+ヤーボイ療法		インターバル:	42 日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
<p>● 患者情報</p> <p>ID 氏名 生年月日 性別 医師名</p>					身長 体重 体表面積	cm kg m ²	
					レジメン説明 催吐性リスク: 最小度		

● 使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	オプジー+ ヤーボイ	240mg 1mg/kg
	点滴静脈内(速度)		

適応条件

● 投与スケジュール

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	所要時間			90分			30分			30分			次クールへ	
					1	15	29	43							
	点滴静脈内(速度)	★オプジー+ ヤーボイ 点滴静注(120mg,240mg) 大塚生食注 ▲100mL▼ 点滴静脈内注射(速度指定あり): * 点滴時間 30分かけて インラインフィルター使用	0mg 1瓶		1本目			1本目			1本目			1本目				
	点滴静脈内(速度)	大塚生食注 ▲100mL▼ 点滴静脈内注射(速度指定あり): * 点滴時間 30分かけて インラインフィルター使用	1瓶		2本目													
	点滴静脈内(速度)	★ヤーボイ点滴静注液(20mg,50mg) ▲50mL▼大塚生食注 (レジメン用) 点滴静脈内注射(速度指定あり): * 点滴時間 30分かけて インラインフィルター使用	0mg 20mL		3本目													
	点滴静脈内	▲50mL▼大塚生食注 全開で点滴	1瓶		4本目			2本目			2本目							

レジメン名	キイトルーダ+FP療法	インターバル:	21日	医師コメント	薬剤師コメント	看護師コメント
● 患者情報						
ID		身長	cm			
氏名		体重	kg			
生年月日		体表面積	m2			
性別				レジメン説明		
医師名				催吐性リスク: 高度		

● 使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	キイトルーダ	200mg
	持続点滴静注	フルオロウラシル	800mg/m2
	点滴静脈内(速度)	シスプラチニ	80mg/m2

● 投与スケジュール

RP	手技	薬剤略称	用量/単位	(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					1週目	2週目	3週目																			
	点滴静脈内(速度) 2時間かけて	点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼	1袋		1本目																					
	点滴静脈内(速度) 30分かけて	★キイトルーダ 100mg/4mL 大塚生食注 ▲100mL▼ インラインフィルター使用	0mg 1瓶		2本目																					
	点滴静脈内(速度) 6分かけて	▲50mL▼大塚生食注	1瓶		3本目																					
	点滴静脈内(速度) 30分かけて	大塚生食注 ▲100mL▼ パロセトム静注0.75mg/5mL (アキシVHJ) ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後) アロカリス点滴静注235mg/10mL(VHJ)	1瓶 1瓶 3管 1瓶		4本目																					
	持続点滴静注 24時間かけて	★フルオロウラシル注1000mg/20mL 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ *点滴速度 23mL/h	0mg 1袋		5本目	1本目	1本目	1本目	1本目																	
	点滴静脈内(速度) 90分かけて	ソルテム3A輸液▼500mL▼ 硫酸Mg補正液20mL(マグネシール代替)	1袋 1筒		5本目																					
	点滴静脈内(速度) 40分かけて	マンニットールS注射液 300mL	1袋		6本目																					
	点滴静脈内(速度) 90分かけて	★シスプラチニ注「マルコ」(10mg,25mg,50mg) 点滴生理食塩バッグ「フロー」▲500mL▼ (レジメン用)	0mg 300mL		7本目																					
	点滴静脈内(速度) 2時間かけて	ソルテム3A輸液▼500mL▼	1袋		8本目																					
	点滴静脈内(速度) 4時間かけて	点滴生理食塩液バッグ「フロー」▼ 1L▼	1袋		9本目																					
	点滴静脈内(速度) 4時間かけて	ゲイソD輸液 500mL(酢酸リンゴルブトウ) ★■デキサート注射3.3mg1ml(デカドロン後)	1袋 2管			1本目	1本目	1本目																		

適応条件

次クールへ

レジメン名

キイトルーダ+フルオロウラシル療法

インターバル： 21 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

ID

氏名

牛年月日

性別

医師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

レジメン説明 催吐性リスク：軽度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	キイトルーダ	200mg
	点滴静脈内(速度)	フルオロウラシル	800mg/m ²

適応条件

● 投与スケジュール

所要時間

次クールへ

レジメン名

パクリタキセル療法（3週投与1週休薬）

インターバル： 28 日

医師コメント

薬剤師コメント

看護師コメント

● 患者情報

1D

氏名

牛年月日

性別

醫師名

身長 cm
体重 kg
体表面積 m²

レジメン説明

催吐性リスク：軽度

● 使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤略称	標準値(1回量)
	点滴静脈内(速度)	パクリタキセル	80mg/m2

適応条件

● 投与スケジュール